

«بەنەم خالق آرامىش»

نام کتاب: داروهای باعواده‌گویان

نام نویسنده: رضا پور درستگردان

تعداد صفحات: ٣٥ صفحه

تاریخ انتشار:



کافیہ بولن

CaffeineBookly.com



@caffeinebookly



caffeinebookly



[@caffeinebookly](#)



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

مطلوب موجود در این دانشنامه

مقدمه

آسپرین
کاپتوپریل
کلونیدین
لودوپا
مترونیدازول
ننومایسین
فوباربیتال
فی تونین
ریفارامپین
تتراسایکلین

مقدمه

دارو های خوراکی به طرق مختلف روی سیستم گوارش تاثیر می گذارند. دارو های نسخه ای و دارو های بدون نسخه هر دو، هر چند ایمن و موثر باشند، ممکن است اثرات مخربی روی برخی افراد داشته باشند. برخی از دارو ها اگر با هم مصرف شوند، ممکن است ایجاد تداخل دارویی و عوارض مخرب جانبی کنند. علاوه بر این، بسیار مهم است که پزشک شما پیش از تجویز داروی جدید، از آرژی ها و حساسیت های و همچنین از بیماری های دیگر شما مطلع باشد

برخی افراد در بلع قرص و کپسول دچار مشکل هستند، یا اینکه گاهی دارو ها را بدون آب میل می کنند. قرص ها و کپسول هایی که در مری گیر می کنند می توانند موجب تحریک پوشش داخلی مری شوند. این مسئله ممکن است موجب ایجاد زخم، خونریزی، سوراخ شدن و تنگی مجرای مری شوند

برخی داروها در فعالیت ماهیچه اسفنکتر تداخل ایجاد می کنند، این ماهیچه بین مری و معده قرار گرفته و پس از بلع غذا، عامل عبور آن به سمت معده است. این مسئله می تواند احتمال ابتلا به رفلاکس یا برگشت محتویات اسیدی معده به مری را افزایش دهد

یکی از شایع ترین عوامل محرك پوشش داخلی معده تحریک آن با داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی است.



این دارو ها شامل ایبوپروفن و دیگر مسکن های رایج است. این داروها قدرت پوشش معده برای مقاومت در برابر اسید تولیدی را کاهش داده و گاهی اوقات می توانند منجر به التهاب پوشش داخلی معده (گاستریت)، زخم ، خونریزی یا سوراخ شدن پوشش معده شوند

داروهای مختلفی موجب یبوست می شوند. و این بدان سبب است که این داروها روی عصب و ماهیچه های کولن (روde بزرگ) تاثیر می گذارند و منجر به دفع سخت و آرام می شوند



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

آسپرین از داروها با عوارض گوارشی است.

آسپرین یک مسكن روزمره برای درد و دردهایی از قبیل سردرد ، درد دندان و درد پریود است . همچنین می تواند برای درمان سرماخوردگی و علائم مانند آنفولانزا و کاهش تب (38 درجه و بالاتر) مورد استفاده قرار گیرد

آسپرین به همراه سایر ترکیبات در برخی از داروهای سرماخوردگی و آنفولانزا نیز موجود است

شما می توانید اکثر آسپرین ها از داروخانه ها ، مغازه ها و سوپر مارکت ها خریداری کنید. برخی از انواع فقط با نسخه در دسترس هستند

این دارو به صورت قرص یا شیاف موجود است

اگر دچار سکته مغزی یا سکته قلبی شده اید یا در معرض خطر بالای حمله قلبی هستید ، پزشک ممکن است توصیه کند که روزانه آسپرین با دوز کم مصرف کنید. این در مصرف آسپرین برای تسکین درد متفاوت است

بهتر است آسپرین را با غذا میل کنید. به این ترتیب ، کمتر به معده ناراحت یا
معده مبتلا خواهد شد.

هرگز آسپرین را به کودکان زیر 16 سال ندهید

دوز آسپرین که برای شما مناسب است بستگی به نوع آسپرینی که می خورید
بستگی دارد ، چرا مصرف می کنید و چه میزان به علائم شما کمک می کند

قرص آسپرین

آسپرین معمولاً به صورت قرص 300 میلی گرم تولید می شود

دوز معمول 1 یا 2 قرص هر 4 تا 6 ساعت است
شیافهای آسپرین دارویی است که شما به آرامی به داخل مقعد خود فشار
می دهید. برای استفاده از آنها ، دستورالعملهای موجود در جزویه داخل بسته را
دنبال کنید

شیافهای آسپرین در 2 نقطه قوت قرار دارند. آنها حاوی 150 میلی گرم یا
300 میلی گرم آسپرین هستند

عوارض جانبی مصرف بالای آسپرین

احساس بیماری (حالت تهوع)

زنگ در گوش (وزوز گوش)

مشکلات شنوایی

گیجی

احساس سرگیجه داشتن

خونریزی راحت تر از حد معمول در مصرف آسپرین زیرا آسپرین خون شما را
رقیق

می کند و گاهی اوقات شما را راحت تر می تواند خونریزی کند. به عنوان مثال ،
ممکن است دچار خونریزی بینی شوید



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

صرف آسپرین به عنوان مسكن در 6 ماهه اول بارداری (حداکثر 30 هفته) بی خطر است

بعد از 30 هفته بارداری آسپرین برای تسکین درد مصرف نکنید.

این بیماری می تواند عوارضی - از جمله مشکلات تنفس و لخته شدن خون - در نوزاد تازه متولد شده ایجاد کند. برای اکثر خانم ها ، پاراستامول بهترین مسكن ضد درد در اواخر بارداری است



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

Side effect of aspirin

عوارض آسپرین

Nausea تهوع

Vomiting استفراغ

Stomach pain درد معده

Clammy skin پوست کم رنگ

Stomach bleeding خونریزی معده



References

- ^ Jump up to:a b Use During Pregnancy and Breastfeeding
- ^ Jump up to:a b c Brayfield, A, ed. (14 January 2014). "Aspirin". Martindale: The Complete Drug Reference. Pharmaceutical Press. Retrieved 3 April 2014.
- ^ Jump up to:a b "Zorprin, Bayer Buffered Aspirin (aspirin) dosing, indications, interactions, adverse effects, and more". Medscape Reference. WebMD. Archived from the original on 7 April 2014. Retrieved 3 April 2014.
- ^ Jump up to:a b c Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 3.8. ISBN 1439855110.
- ^ Jump up to:a b c d e f g h i j k l m "Aspirin". Drugs.com. American Society of Health-System Pharmacists. 6 June 2016. Archived from the original on 25 April 2017. Retrieved 30 August 2016.
- ^ Patrignani P, Patrono C (August 2016). "Aspirin and Cancer". Journal of the American College of Cardiology. 68 (9): 967–76. doi:10.1016/j.jacc.2016.05.083. PMID 27561771.
- ^ Jump up to:a b Jones A (2015). Chemistry: An Introduction for Medical and Health Sciences. John Wiley & Sons. pp. 5–6. ISBN 978-0-470-09290-3.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

کاپتوپریل از داروها با عوارض گوارشی است

کاپتوپریل برای درمان فشار خون بالا (فشار خون بالا) ، نارسایی احتقانی قلب ، مشکلات کلیوی ناشی از دیابت و برای بهبود بقا پس از حمله قلبی استفاده می شود

در صورت ابتلا به بیماری کلیوی ممکن است از مصرف کاپتوپریل خودداری کنید

کاپتوپریل را دقیقاً طبق تجویز پزشک مصرف کنید. تمام راهنمایی های موجود در برچسب نسخه خود را دنبال کنید. پزشک ممکن است گاهی اوقات دوز شما را تغییر دهد. از این دارو در مقادیر بزرگتر یا کمتر یا بیشتر از مقدار توصیه شده استفاده نکنید

اگر به عمل جراحی نیاز دارید ، قبل از موعد به جراح بگویید که از کاپتوپریل استفاده می کنید. ممکن است نیاز به استفاده از دارو برای مدت کوتاهی متوقف شود

اگر تحت فشار خون بالا قرار گرفته اید ، حتی اگر احساس خوبی دارید ، از این دارو استفاده کنید. فشار خون بالا اغلب بدون علامت است. ممکن است شما نیاز به استفاده از داروهای فشار خون در طول عمر خود داشته باشید

نوشیدن الک می تواند فشار خون شما را پایین بیاورد و برخی از عوارض جانبی کپتوپریل را افزایش می دهد

در هنگام مصرف کپتوپریل از جایگزین های نمک یا مکمل های پتابسیم استفاده نکنید

Side effect of captopril

عوارض کاپتوپرول

Cough سرفه

Stomach bleeding خونریزی معده

Stomach pain درد معده

Mouth ulcer زخم دهان

Breath damage آسیب تنفس

Swelling tongue تورم زبان

References

Jump up to: a b Fischer, Jnos; Ganellin, C. Robin (2006). *Analogue-based Drug Discovery*. John Wiley & Sons. p. 467. ISBN 9783527607495.

Akif, M.; Georgiadis, D.; Mahajan, A.; Dive, V.; Sturrock, E. D.; Isaac, R. E.; Acharya, K. R. (2010). "High-Resolution Crystal Structures of *Drosophila melanogaster* Angiotensin-Converting Enzyme in Complex with Novel Inhibitors and Antihypertensive Drugs". *Journal of Molecular Biology*. 400 (3): 502–517. doi:10.1016/j.jmb.2010.05.024. PMID 20488190.

Novel Pharmacological Approaches to the Treatment of Depression Archived May 12, 2008, at the Wayback Machine

Attoub S; Gaben AM; Al-Salam S; et al. (September 2008). "Captopril as a potential inhibitor of lung tumor growth and metastasis". *Ann. N. Y. Acad. Sci.* 1138: 65–72. doi:10.1196/annals.1414.011. PMID 18837885.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

کلونیدین از داروهای با عوارض گوارشی است

کلونیدین با کاهش میزان برخی مواد شیمیایی خاص در خون ، فشار خون را کاهش می دهد. این باعث می شود رگ های خونی شما شل شود و قلب شما به آرامی و راحت تر میزند

قبل از مصرف کلونیدین از نظر بیماری قلبی یا بیماری شدید عروق کرونر ، اختلال در ریتم قلب ، ضربان قلب آهسته ، فشار خون پایین ، سابقه حمله قلبی یا سکته مغزی ، بیماری کلیوی بررسی شوید

کلونیدین می تواند به شیر مادر منتقل شود و ممکن است به یک کودک شیرده آسیب برساند. در صورت شیردهی کودک به پزشک خود بگویید

استفاده از کلونیدین را به طور ناگهانی متوقف نکنید ، یا ممکن است علائم ترک ناخوشایند داشته باشد



علام مصرف بیش از حد ممکن است شامل فشار خون بسیار خطرناک (سردرد شدید ، ضربان در گردن یا گوش ، ضعف بینی ، اضطراب ، درد قفسه سینه ، تنگی نفس) و به دنبال آن فشار خون پایین باشد

سایر علام مصرف بیش از حد ممکن است شامل احساس سرماخوردگی ، ضعف شدید یا خواب آلودگی ، تنفس ضعیف یا کم عمق عوارض جانبی کلونیدین رایج ممکن است شامل موارد زیر باشد

خواب آلودگی ، سرگیجه؛

احساس خستگی یا تحریک پذیری؛

خشکی دهان ، از دست دادن اشتها

یبوست

خشکی چشم

مشکلات خواب (بی خوابی) ، کابوس ها



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

Side effect of clonidine

عوارض کلونیدین

Dry mouth خشکی دهان

Stomach bleedings خونریزی معدود

Stomach pain درد معده

Constipation بیوست

Headaches سردرد

Tiredness خستگی

References

^ Jump up to:a b c d "clonidine (Rx) - Catapres, Catapres-TTS, more." Medscape Reference. WebMD. Retrieved 10 November 2013.

^ Jump up to:a b Lowenthal, DT; Matzek, KM; MacGregor, TR (May 1988). "Clinical pharmacokinetics of clonidine". Clinical Pharmacokinetics. 14 (5): 287–310. doi:10.2165/00003088-198814050-00002. PMID 3293868.

^ "Kapvay". RxList.

^ Jump up to:a b c d e f g h "Clonidine Monograph for Professionals". Drugs.com. American Society of Health-System Pharmacists. Retrieved 2 February 2019.

^ Jump up to:a b c British national formulary : BNF 76 (76 ed.). Pharmaceutical Press. 2018. p. 144. ISBN 9780857113382.

^ Neil, MJ (November 2011). "Clonidine: clinical pharmacology and therapeutic use in pain management". Current Clinical Pharmacology. 6 (4): 280–7. doi:10.2174/157488411798375886. PMID 21827389.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

^ Stähle, Helmut (June 2000). "A historical perspective: development of clonidine". Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology. 14 (2): 237–246.
doi:10.1053/bean.2000.0079.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

لودوپا از داروها با عوارض گوارشی است.

لودوپا به تنهایی یا همراه با کاربی دوپا برای درمان بیماری پارکینسون استفاده می شود که گاهی به آن فلچ لرزش گفته می شود. برخی از بیماران به ترکیب دارو احتیاج دارند ، در حالی که برخی دیگر تنها از لودوپا بهره مند می شوند. با بهبود کنترل عضلات ، لودوپا امکان حرکت طبیعی تر بدن را فراهم می کند

لودوپا پیش ساز دوپامین است و عمدتاً با تامین دوپامین کاهش یافته استریاتوم عمل می کند

لودوپا از روده کوچک سریعاً جذب می شود، اما جذب آن به سرعت تخلیه معده و محتویات آن بستگی دارد

عارض جانبی لودوپا

بی اشتہایی، تهوع استفراغ، بی خوابی، سراسیمگی، کاهش فشارخون وضعیتی، گیجی، تپش قلب، آریتمی، قرمز رنگ شدن ادرار و سایر میعادت بدن، حرکات غیر ارادی و غیر طبیعی، هیپومنیا و سایکوز که ممکن است باعث محدود شدن مقدار مصرف شوند

در طول چند ماه اول درمان، این دارو بهتر است همراه با غذا مصرف شود
دوره درمان با این دارو باید کامل شود. بدون مشورت با پزشک مصرف این
دارو نباید قطع شود



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

Side effect of levodopa

عوارض لودوپا

Diarrhea اسهال

Dry mouth خشکی دهان

Constipation بیوست

Stomach pain درد معدہ

Stomach bleeding خون ریزی معدہ

References

^ Lopez VM, Decatur CL, Stamer WD, Lynch RM, McKay BS (September 2008). "L-DOPA is an endogenous ligand for OA1". PLoS Biology. 6 (9): e236. doi:10.1371/journal.pbio.0060236. PMC 2553842. PMID 18828673.

^ Hiroshima Y, Miyamoto H, Nakamura F, Masukawa D, Yamamoto T, Muraoka H, Kamiya M, Yamashita N, Suzuki T, Matsuzaki S, Endo I, Goshima Y (January 2014). "The protein Ocular albinism 1 is the orphan GPCR GPR143 and mediates depressor and bradycardic responses to DOPA in the nucleus tractus solitarius". British Journal of Pharmacology. 171 (2): 403–14. doi:10.1111/bph.12459. PMC 3904260. PMID 24117106.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

مترونیدازول از داروها با عوارض گوارشی است.

از مترونیدازول برای درمان عفونتهای باکتریایی واژن ، معده یا روده ، کبد ، پوست ، مفاصل ، مغز ، قلب و دستگاه تنفسی استفاده می شود

تشنج و سایر ناهنجاریهای سیستم عصبی در بیماران تحت درمان با مترونیدازول گزارش شده است. شما باید مترونیدازول را فوراً متوقف کنید تا علامت عصبی مانند تشنج ، سردرد ، تغییرات بینایی ، ضعف ، بی حسی یا سوزن سوزن را متوقف کنید

استفاده از مترونیدازول در سه ماهه اول بارداری می تواند به نوزاد متولد نشده آسیب برساند. اگر باردار هستید یا در حین استفاده از این دارو باردار هستید به پزشک خود بگویید

این دارو را می توان با وعده های اصلی غذا یا مقداری خوراکی مصرف کرد تا معده را ناراحت نکند. بهتر است این دارو طی شبانه روز در نوبت هایی با فواصل یکسان مصرف شود تا سطح دارو در خون ثابت باقی بماند.



اگر قرار است روزی ۴ نوبت این قرص را مصرف کنید بهتر است هر ۶ ساعت
یک بار باشد. درباره میزان جذب این دارو میتوان گفت حدود ۸۰ درصد داروی
خوراکی جذب میشود. لازم به ذکر است که غذا سرعت جذب را به تأخیر
میاندازد اما در مقدار جذب تاثیری ندارد

به طور کلی این دارو ممکن است باعث عوارض جانبی همچون سرگیجه،
سردرد، اسهال، تهوع و استفراغ، درد معده، کاهش اشتها، یبوست و خشکی
دهان شود

Side effect of metronidazole

عوارض مترونیدازول

Nausea استفراغ

Vomiting تهوع

Diarrhea اسهال

Depression افسردگی

Constipation بیوست

headaches سردرد

References

[^] Jump up to:a b c d e f g "Flagyl, Flagyl ER (metronidazole) dosing, indications, interactions, adverse effects, and more".

Medscape Reference. WebMD. Archived from the original on 7 April 2014. Retrieved 3 April 2014.

[^] Jump up to:a b c d e Brayfield, A, ed. (14 January 2014).

"Metronidazole". Martindale: The Complete Drug Reference. Pharmaceutical Press. Retrieved 3 April 2014.[dead link]

[^] Brayfield, Alison, ed. (2017). Martindale: The Complete Drug Reference (39th ed.). London: Pharmaceutical Press. ISBN 978 0 85711 309 2.

[^] Jump up to:a b c d e f g h i "Metronidazole". The American Society of Health-System Pharmacists. Archived from the original on 6 September 2015. Retrieved 31 July 2015.

[^] Jump up to:a b c McDonald LC, Gerding DN, Johnson S, Bakken JS, Carroll KC, Coffin SE, et al. (March 2018). "Clinical Practice Guidelines for Clostridium difficile Infection in Adults



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

and Children: 2017 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)". Clinical Infectious Diseases. 66 (7): e1–e48.
doi:10.1093/cid/cix1085. PMC 6018983. PMID 29462280.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

نئومایسین از داروهای با عوارض گوارشی است

نئومایسین یک آنتی بیوتیک است که باکتری های بدن را مبارزه می کند

از نئومایسین برای کاهش خطر عفونت در حین جراحی روده استفاده می شود.

از نئومایسین نیز برای کاهش علائم کما کبدی استفاده می شود

نئومایسین در درمان اسهال عفونی، سرکوب باکتری های روده ای قبل از عمل جراحی، درمان کمکی در کومای کبدی و برای پایین آورد چربی خون مصرف می شود

روش و مقدار مصرف

بالغین: در درمان اسهال عفونی روزانه 50 میلی گرم / کیلوگرم از راه خوراکی در 4 دوز منقسم (هر 6 ساعت) به مدت 2 تا 3 روز مصرف می شود



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

کودکان: در درمان اسهال عفونی روزانه 50 تا 100 میلی گرم/کیلوگرم از راه خوراکی هر 4 تا 6 ساعت به مدت 2 تا 3 روز مصرف می شود

ننومایسین یک باکتریوسید است. مانع سنتز پروتئین در باکتری می شود و از این طریق موجب مرگ باکتری های در حال رشد و تقسیم می گردد

از این دارو قبل از عمل جراحی می توان استفاده کرد که باعث می شود باکتری ها را از دستگاه گوارش پاک کند.

در اسهال عفونی نیز کاربرد دارد. درمان کمکی در کومای کبدی است. همچنین می تواند در پایین آوردن چربی خون نیز موثر باشد زیرا در افرادی که سطح اسید های صفراوی بالایی دارند، این دارو می تواند به اسید های صفراوی متصل شود و از بازجذب و چرخه آنها جلوگیری می کند

استفاده از این دارو برای دوره های مکرر یا طولانی ممکن است عفونت چشمی جدید قارچی بدهد و ممکن است مشکلات دیگر چشمی بدهد مثل گلوكوم و آب مروارید و یا تاخیر ترمیم زخم ها



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

اگر ترشح چشم، مشکلات بینایی و یا درد در چشم ها داشتید فورا به پزشک
اطلاع دهید



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

Side effect of neomycin

عوارض نومایسین

Rash پوستی راش

Itching خارش

Abdominal pain درد شکم

Stomach bleeding خونریزی معده

References

[^] Fischer, Jnos; Ganellin, C. Robin (2006). **Analogue-based Drug Discovery**. John Wiley & Sons. p. 507. ISBN 9783527607495.

[^] Hellman, L. M. "Neomycin, a New Antibiotic Active Against Streptomycin-Resistant Bacteria, Including Tuberculosis Organisms." **American Journal of Obstetrics and Gynecology** 58.6 (1949): 1224. CrossRef. Web.

[^] Heidary, Noushin; Cohen, David E. (2005). "Hypersensitivity reactions to vaccine components". **Dermatitis**. 16 (3): 115–20. doi:10.1097/01206501-200509000-00004. PMID 16242081.

[^] DermNet dermatitis/neomycin-allergy

[^] "Your Medicine Cabinet". DERMAdoctor.com, Inc. Archived from the original on 2009-07-09. Retrieved 2008-10-19.

[^] "Neomycin sulfate, EP Susceptibility and Minimum Inhibitory Concentration (MIC) Data" (PDF). TOKU-E.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

**^ Zug, K. A.; Warshaw, E. M.; Fowler Jr, J. F.; Maibach, H. I.;
Belsito, D. L.; Pratt, M. D.; Sasseville, D; Storrs, F. J.; Taylor, J.
S.; Mathias, C. G.; Deleo, V. A.; Rietschel, R. L.; Marks, J (2009).**

**"Patch-test results of the North American Contact Dermatitis
Group 2005-2006". Dermatitis. 20 (3): 149–60.**

**doi:10.2310/6620.2009.08097 (inactive 2019-08-20). PMID
19470301.**



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

فنوباربیتال از داروها با عوارض گوارشی است.

فنوباربیتال برای درمان یا جلوگیری از تشنج استفاده می شود . از فنوباربیتال نیز به عنوان آرام بخش برای کوتاه مدت استفاده می شود

فنوباربیتال در تمام انواع صرع کوچک و در حمله مداوم صرعي به کار می رود.
فنوربابیتال تزریقی برای درمان اضطراری بعضی از حملات تشنجی حاد از جمله حملات همراه با اکلامپسی ،منژیت و واکنشهای سمی به استریکنین و همچنین جهت پیشگیری و درمان حملات تشنجی ناشی از تب مصرف می شود

عوارض جانبی فنوباربیتال

خواب آلودگی، افسردگی ذهنی، عدم تعادل، واکنشهای آلرژیک پوستی، تحریک پذیری، بیقراری و اختشاش شعور در سالمندان، هیجانات و فعالیت زیاد غیرعادی در کودکان، کم خونی مگالوبلاستیک از عوارض جانبی این دارو می باشند

در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود،



ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد، از مصرف نوبت
فراموش شده و دوپراپر کردن مقدار مصرف بعدی باید خودداری شود



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

Side effect of phenobarbital

عوارض فنوباربیتال

Nausea استفراغ

Vomiting تهوع

Headache سردرد

Fever تب

Stomach bleeding خون ریزی معده

References

[^] Bassert, Joanna M. (2017). McCurnin's Clinical Textbook for Veterinary Technicians - E-Book. Elsevier Health Sciences. p. 955. ISBN 9780323496407.

[^] Jump up to:a b c d e f g h i j k l m "Phenobarbital". The American Society of Health-System Pharmacists. Archived from the original on 2015-09-06. Retrieved Aug 14, 2015.

[^] Jump up to:a b Marx, John A. (2010). Rosen's emergency medicine : concepts and clinical practice (7 ed.). Philadelphia: Mosby/Elsevier. p. 1352. ISBN 978-0-323-05472-0. Archived from the original on 2016-03-05.

[^] Jump up to:a b Ilangaratne, NB; Mannakkara, NN; Bell, GS; Sander, JW (Dec 1, 2012). "Phenobarbital: missing in action". Bulletin of the World Health Organization. 90 (12): 871–871A. doi:10.2471/BLT.12.113183. PMC 3524964. PMID 23284189.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

[^] Brodie, MJ; Kwan, P (December 2012). "Current position of phenobarbital in epilepsy and its future". *Epilepsia*. 53 Suppl 8: 40–6. doi:10.1111/epi.12027. PMID 23205961.

[^] "The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care NICE guidelines [CG137]". National Institute for Health and Care Excellence. January 2012. Missing or empty |url= (help)

[^] "Prescribing medicines in pregnancy database". Australian Government. 3 March 2014. Archived from the original on 8 April 2014. Retrieved 22 April 2014.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

فني توئين از داروهای با عوارض گوارشی است

فني توئين يك داروي ضد صرع است که به آن ضد تشنج نيز می گويند .

فني توئين با كندی تکانه در مغز که باعث تشنج می شود کار می کند

از فني توئين برای کنترل تشنج استفاده می شود . اين بيماري تمام انواع تشنج را درمان نمی کند و پزشك معالج تعیین می کند که آيا اين دارو مناسب برای شما است یا خير

میزان دقیق مصرف اين دارو حتما باید توسط پزشك متخصص تعیین گردد. به طور معمول به منظور کنترل حملات تشنج در بزرگسالان ابتدا ۱۲۵ میلیگرم سه بار در روز از سوسپانسیون خوراکی و ۱۰۰ میلیگرم از کپسول مصرف می شود و سپس مقدار مصرف بر حسب نیاز و تحمل بيمار ۷-۱۰ روز تنظیم می گردد

اين دارو در افراد مبتلا به نارسايی کبد، پورفيری، نارسايی کلیه و همچنین افراد حساس به دارو نباید مصرف شود

فني توئين متابوليسم داروهای ضد بارداری خوراکی را افزایش و در نتیجه اثر آنها را کاهش می دهد



به منظور کاهش تحریک گوارش می‌توان دارو را با غذا یا شیر مصرف کرد
به منظور بررسی پیشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشک ضروری است
در صورت نیاز به هرگونه عمل جراحی، باید پزشک از مصرف دارو مطلع باشد

از قطع ناگهانی مصرف دارو باید خودداری شود، زیرا امکان بروز ناگهانی
حملات تشنجمی وجود دارد

تتراسایکلین از آنتی بیوتیک ها با عوارض گوارشی است

تتراسایکلین برای درمان عفونتهای مختلف باکتریایی پوست ، روده ها ، مجاری تنفسی ، مجاری ادراری ، دستگاه تناسلی ، خدد لنفاوی و سایر سیستم های بدن مورد استفاده قرار می کیرد. این اغلب در درمان آنکه های شدید یا بیماری های مقاربته مانند سفلیس ، سوزاک یا کلامیدیا استفاده می شود

استفاده از تتراسایکلین در دوران بارداری می تواند به نوزاد متولد نشده آسیب برساند یا باعث تغییر رنگ دائمی دندان ها بعدا در زندگی کودک شود

عارض جدی تتراسایکلین

سردرد شدید، سرگیجه، تاری دید

تب و لرز و بدن درد و دیگر علام آنفولانزا

تاول شدید، لایه برداری و جوش های قرمز پوست

کاهش غیر طبیعی و یا قطع شدن ادرار

تغییر رنگ پوست و زرد شدن آن، تیره شدن ادرار، تب، گیجی و یا احساس

ضعف



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

درد شدید در قسمت فوقانی معده و گسترش آن به پشت، حالت تهوع و استفراغ،
سریع شدن ضربان قلب

از دست دادن اشتها، زردی پوست و چشم

کبودی و یا خونریزی، ضعف غیر طبیعی

.تتراسایکلین در افرادی که حساسیت مفرط به دارو دارند، منع مصرف دارد.

.تتراسایکلین در بارداری به خصوص در نیمه دوم بارداری منع مصرف دارد.

تتراسایکلین در کودکان زیر 8 سال منع مصرف دارد



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

Side effect of tetracycline

عوارض تتراسيكلين

Hive كهير

Yellow skin پوست زرد

Vomiting استفراغ

Stomach pain درد معدہ

References

[^] Jump up to: a b c d e f g h i j k "Tetracycline". The American Society of Health-System Pharmacists. Archived from the original on 28 December 2016. Retrieved 8 December 2016.

[^] Fischer, Janos; Ganellin, C. Robin (2006). *Analogue-based Drug Discovery*. John Wiley & Sons. p. 489. ISBN 9783527607495. Archived from the original on 2016-12-20.

[^] "WHO Model List of Essential Medicines (19th List)" (PDF). World Health Organization. April 2015. Archived (PDF) from the original on 13 December 2016. Retrieved 8 December 2016.

[^] "Tetracycline HCL". International Drug Price Indicator Guide. Archived from the original on 10 May 2017. Retrieved 8 December 2016.

[^] Hamilton, Richart (2015). *Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2015 Deluxe Lab-Coat Edition*. Jones & Bartlett Learning. p. 107. ISBN 9781284057560.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly